



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale


Bollettino Fitosanitario VITE n. 12 del 31/07/2018

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica: BBCH 79 – La maggior parte degli acini si tocca; BBCH 81 - 50% dell'invaiaatura

Chiusura grappolo

Gli acini iniziano a toccarsi



Invaiaatura

Gli acini iniziano ad assumere il colore tipico della varietà

Codice BBCH: 81

PERONOSPORA

Presenza di peronospora nell'area del Trasimeno, Narni, Orvieto, Montefalco, Colli Perugini-Torgiano (Dati Progetto Smartmeteo - <http://cratia.it/smartmeteo/>). In presenza di prolungate bagnature intervenire preferibilmente con prodotti rameici in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario.

OIDIO

Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente Zolfi bagnabili assicurando una copertura continua in funzione della persistenza del prodotto fitosanitario precedentemente utilizzato oppure intervenire con zolfo in polvere.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Fase crescente del volo della 3 generazione carpofaga. Si registrano catture ridotte nelle trappole monitorate dal Progetto Smartmeteo. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve. I prodotti fitosanitari impiegabili sono riportati nel disciplinare di difesa integrata valido per l'anno 2017-2018.

Si ricorda che la s.a. clorpirifos-etile si può impiegare soltanto in pre-fioritura come da nuova etichetta.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria il Disciplinare di difesa integrata per l'anno 2017-2018 è disponibile al seguente link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/12682939/Disciplinare+Difesa+Integrata+2018+COLT+URE+FRUTTICOLE.pdf/d715a3d7-0087-4be4-8cc0-ef3cc52c3c2d>